

## Disparidades en la Salud: VIH/SIDA

access advocacy  
african american  
asian american bone  
density cancer children  
cardiovascular  
cholesterol chronic  
disease churches  
collaboration community  
cultural competence  
DIABETES diet disability  
disparities  
diversity education  
environment evaluation  
ethnicity exposure faith  
community financial  
need goals grassroots  
health insurance  
healthcare providers  
heart disease higher  
rates healthy hispanic  
american hypertension  
HIV/AIDS insurance  
infant mortality  
initiative intervention  
language barriers LEAD  
life expectancy lifestyle  
low birthweight  
literacy malnutrition  
medicare/medicaid men  
mental health native  
american nutrition  
obesity partnership  
overweight pollution  
prenatal prescription  
drugs prevention quality  
of care race risk factors  
RURAL schools self-  
esteem socioeconomics  
solutions stereotypes  
surveillance technology  
teenagers tobacco  
tracking transportation  
treatment TRUST urban  
underutilization  
unequal care under-  
representation  
violence vaccinations  
water quality welfare policy  
women wellness white  
workplace diversity

La infección por VIH es la quinta causa principal de muerte en personas que tienen entre 25 y 44 años de edad en los Estados Unidos. Hay entre 850,000 y 950,000 residentes de los Estados Unidos que padecen de infección por VIH y aproximadamente 40,000 nuevas infecciones de VIH se presentan cada año en los Estados Unidos.<sup>1</sup>

**Las tasas de incidencia de VIH/SIDA varían dependiendo de la raza y etnicidad de una persona:** Los afroamericanos e hispanos representan alrededor de un cuarto de la población de los Estados Unidos y más de la mitad de los casos recientemente reportados de SIDA.<sup>1</sup>

■ **Índices de mortalidad de VIH/SIDA por cada 100,000 personas:**<sup>7</sup>

- Tres para blancos.
- Siete para hispanos.
- Veinticuatro para afroamericanos.

■ **Afroamericanos.** En 2001, la tasa de incidencia de SIDA para afroamericanos fue nueve veces más alta que la informada entre los blancos.<sup>2</sup> Los índices de mortalidad por VIH/SIDA para afroamericanos son siete veces más altos que las de los blancos.<sup>3</sup>

■ **Hispanos.** Los hispanos tienen tasas de incidencia de SIDA más altas que los blancos.<sup>7</sup>

■ **Nativos de Alaska.** Los nativos de Alaska tienen tasas más altas de VIH/SIDA que la población total de Alaska.<sup>4</sup>

**Incidencia de VIH/SIDA en hombres de minorías raciales/étnicas:** Aproximadamente 57 por ciento de los hombres que viven con SIDA son afroamericanos e hispanos.<sup>2</sup>

■ **Hombres afroamericanos.** Los hombres afroamericanos representan el 43 por ciento de los casos de VIH reportados entre los hombres en 2001.<sup>2</sup> Treinta y dos por ciento de los hombres afroamericanos entre 23 y 29 años que tienen sexo con hombres padecen de VIH comparados con siete por ciento para los blancos.<sup>2</sup> El SIDA es la causa principal de muerte entre los hombres afroamericanos de entre 35 y 44 años de edad.<sup>2</sup>

■ **Hombres latinos.** Los hombres latinos entre 23 y 29 años que tienen sexo con hombres tienen el doble de la tasa de infección por VIH que los hombres blancos.<sup>2</sup>

**Incidencia de VIH/SIDA en mujeres de minorías raciales/étnicas:** Aproximadamente 78 por ciento de las mujeres infectadas con VIH son provenientes de minorías.<sup>1</sup>

■ **Mujeres afroamericanas.** La tasa de infección de VIH entre mujeres afroamericanas entre 20 y 44 años, fue cuatro veces más alta que la de las latinas y más de 16 veces más alta que la de las mujeres blancas de la misma edad.<sup>2</sup> El SIDA es la causa principal de muerte entre las mujeres afroamericanas de entre 25 y 34 años.<sup>2</sup>

■ **Incidencia de VIH/SIDA en jóvenes de minorías raciales/étnicas:** Los niños afroamericanos e hispanos representan más del 80 por ciento de los casos de SIDA pediátrico.<sup>1</sup>

■ **Jóvenes afroamericanos.** Los niños afroamericanos representan casi 59 por ciento de todos los casos de SIDA pediátrico.<sup>2</sup> Las mujeres afroamericanas jóvenes tienen siete veces más probabilidades y los hombres afroamericanos jóvenes tienen cuatro veces más probabilidades de ser infectados con el VIH que los blancos de la misma edad.<sup>2</sup>

**Algunas razones potenciales para las disparidades en las tasas de incidencia de VIH/SIDA:**

■ **Atención desigual.** Los pacientes afroamericanos e hispanos con VIH sólo tienen la mitad de probabilidades que los blancos de participar en pruebas clínicas de nuevos medicamentos.<sup>5</sup> Los afroamericanos con VIH tienen menos probabilidades que los blancos de recibir terapia anti-retroviral, inhibidores de proteasa y profilaxis para neumonía neumocística.<sup>6</sup>

■ **Factores de riesgo elevados.** Ciertas ETS pueden incrementar significativamente las probabilidades de contraer VIH. Los afroamericanos tienen 27 veces más probabilidades de padecer de gonorrea y 16 veces probabilidades de contraer sífilis.<sup>2</sup>

■ **Barreras culturales que afectan a la prevención.** Algunas mujeres hispanas pueden sentirse impotentes para actuar sin el consentimiento de los hombres en su vida y tienen expectativas estereotipadas sobre la virginidad y la falta de deseo sexual. Esta tendencia cultural hace difícil que estas mujeres busquen información sobre VIH y se sometan a análisis.<sup>6</sup> Algunos afroamericanos se resisten a reconocer temas sensibles como la homosexualidad y el uso de drogas que están asociados con la infección de VIH.<sup>2</sup>

■ **Educación.** El índice de mortalidad por SIDA para gente con una educación inferior a la secundaria es cinco veces más alto que la tasa de personas con una educación universitaria.<sup>7</sup>

■ **Ingreso.** Existe una relación directa entre tasas de SIDA más elevadas y niveles de ingreso más bajos. Casi uno de cada cuatro afroamericanos vive en estado de pobreza.<sup>2</sup>

1. <http://www.cdc.gov/omh/AMH/factsheets/hiv.htm>
2. <http://www.cdc.gov/hiv/pubs/facts/afam.htm>
3. "Healthy People 2010: An Overview," [www.healthypeople.gov](http://www.healthypeople.gov) [Gente Sana 2010: Un Panorama]
4. [http://www.hss.state.ak.us/dph/targets/ha2010/PDFs/19\\_HIV\\_STD.pdf](http://www.hss.state.ak.us/dph/targets/ha2010/PDFs/19_HIV_STD.pdf)
5. <http://www.ahcpr.gov/research/may02/0502RA6.htm#head1>
6. <http://hab.hrsa.gov/publications/august2002.htm>
7. "National Healthcare Disparities Report," US Dept Health and Human Services, December 2003, Prepublication Copy. [Informe Nacional sobre Disparidades en Cuidados de Salud, Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Diciembre de 2003, Copia de Pre-publicación]

